

### **Rekomendasi Pengendalian *Oidium* sp. pada Karet**

Menurut Harni (2013) pengendalian *Oidium* sp. dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

1. Sebaiknya tidak menanam klon-klon rentan penyakit gugur daun *Oidium* sp.
2. Merangsang pembentukan daun baru lebih cepat atau lebih awal sehingga dapat terhindar dari serangan *Oidium* sp. Pembentukan daun baru dapat dirangsang dengan pemberian pupuk nitrogen satu kali dosis anjuran.
3. Melindungi tanaman dengan fungisida Bayfidan 250 EC, Bayleton 250 EC, belerang atau Tilt 250 EC. Penggunaan fungisida dilakukan seminggu sekali sebanyak 5 kali, dimulai pada waktu 10% pohon membentuk daun baru dan gejala *Oidium* sp. muncul. Penggunaan tepung belerang 10-15 kg/ha dilakukan dengan cara penghembusan dengan alat penghembus bermotor pada pagi hari agar fungisida mudah melekat pada permukaan daun yang masih basah dan tidak mudah diterbangkan oleh angin. Sementara untuk penggunaan Bayleton 250 EC, Bayfidan 250 EC atau Tilt 250 EC dilakukan dengan alat penyemprot bermotor atau alat pengabut.
4. Pada tanaman menghasilkan (TM) pengendalian menggunakan fungisida tidak ekonomis, biasanya serangan penyakit ini dibiarkan saja (tidak dikendalikan). Pada tanaman TP pengendalian dilakukan dengan pemberian pupuk ekstra pada awal dan akhir musim hujan.